

## University of Groningen

### Speekselkliergezwellen

Molenaar, Bauco Bart

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1958

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Molenaar, B. B. (1958). *Speekselkliergezwellen: Kliniek, pathologische anatomie en resultaten van de operatieve behandeling*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

#### Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

#### Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

## STELLINGEN

### I.

Diagnostische punctie van gezwellen, die vermoedelijk op weefsel-nieuwvorming berusten, is ongewenst.

### II.

Aangenomen mag worden, dat aanvankelijk geheel goedaardige speekselklier-menggezwellen op den duur kwaadaardig kunnen worden.

### III.

Postoperatieve nabestraling heeft een gunstige invloed ter voorkoming van recidief bij de behandeling van speekselklier-menggezwellen.

### IV.

Bij behandeling van cylindromen van de oorspeekselklier is zeer ruime extirpatie zonder ontzien van de aangezichtszenuw noodzakelijk.

### V.

Het is niet uitsluitend de hoeveelheid vet, die tengevolge van een fractuur in de bloedstroom komt, welke de ernst van een vetembolie bepaalt.

### VI.

Het geven van barbituraten als inleiding van de narcose bij patienten met een hypoventilatie-syndroom (hypoxaemie en hypercapnie) is absoluut gecontraïndiceerd.

## VII.

Ambulante behandeling van de ziekte van Perthes met een ontlastende beugel of draagband is te verkiezen boven langdurige bedrust met extensie-behandeling.

EVANS - J. Bone Jt. Surg. 40b : 168, 1958.

EVANS e.a. - J. Bone Jt. Surg. 40b : 182, 1958.

## VIII.

Na lumbale sympathectomie dient rekening te worden gehouden met het ontstaan van een verminderde huidcirculatie in de bovenste extremiteiten.

## IX.

Bij urolithiasis op de kinderleeftijd is het onder meer van belang de oxaalzuur-uitscheiding in de urine te bepalen.

ARCHER e.a. - Lancet 2 : 320 1957.

## X.

Wanneer bij de behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom adrenalectomie wordt overwogen, dient deze ingreep steeds door ovariectomie te zijn voorafgegaan of ermee te worden gecombineerd.

STRUTHERS - Brit. med. J. 1 : 1331, 1956.

PEARSON e.a. - J. Amer. med. Ass. 154:234, 1954.

## XI.

Bij hardnekkige gevallen van herpes corneae is een lamellaire keratoplastiek geïndiceerd.

HOGAN - Amer. J. Ophthal. 45 : 106, 1958.

ORMSBY - Amer. J. Ophthal. 45 : 179, 1958.

## XII.

Bij chronische papuleuze afwijkingen in de oksels moet het gebruik van zirconium-bevattende desodorerende sticks als oorzaak worden overwogen.

SHELLEY e.a. - Brit. J. Derm. 70 : 75, 1958.